

Paradigme de Programare

S.I. dr. ing. Andrei Olaru

Departamentul Calculatoare

2015 – 2016, semestrul 2

Cursul 3: Anexă: Recapitulare Calcul λ

Cursul 3: Anexă: Recapitulare Calcul λ

- 1 Introducere
- 2 Lambda-expresii
- 3 Reducere
- 4 Evaluare
- 5 Limbajul lambda-0 și incursiune în TDA
- 1 Recapitulare Calcul λ

Recapitulare Calcul λ

λ -expresie

Sintaxa pentru calcul λ

• O λ -expresie poate fi:

- x
- $\lambda x.E$ E λ -expresie
- $(F A)$ F, A λ -expresii

Exemple:

- $\lambda x.x$
- $\lambda x.\lambda y.(x\ y)$
- $(\lambda x.x\ \lambda x.x)$

β Redex

Ce reducem?

- Sursa pentru β -reducere și pasul de reducere.
- Este o funcție care se poate aplica.

$$(\lambda x. \underbrace{}_{\text{corp}} \underbrace{}_{\text{parametru actual}})$$

- x : numele parametrului formal.

β -reducere

Cum reducem?


substituție textuală

$$(\lambda x. \underbrace{\text{corp}}_{\text{parametru actual}}) \xrightarrow{\beta} \underbrace{\text{corp}}_{\text{[parametru actual/x]}}$$

aparițiile libere ale lui x din corp sunt substituite textual cu parametrul actual

Substituție

Ce substituim?



- O apariție x este legată de cea mai interioară definiție λx , care conține apariția în corpul său. Dacă λx care îl leagă este inclus în expresia E , apariția este legată în E , altfel este liberă în E .
- x are o apariție liberă în $E \Rightarrow x$ variabilă liberă în E (altfel legată).
- \nexists variabile libere în $E \Rightarrow E$ închisă.

Condiții β -reducere pentru $(\lambda x.E) A$

Când este corect să efectuăm substituția?

- Variabilele **libere** din A nu devin **legate** în $E_{[A/x]}$
- Mai precis, numele variabilelor libere din A nu sunt nume de variabile care sunt legate în contextele din E în care apare x .
- Exemplu: $(\lambda x.\lambda y.(y \ x) \ \lambda z.y) \rightarrow$ incorrect să efectuăm β -reducere.

α -conversie în $(\lambda x.E) A$

Cum rezolvăm problema anterioară?

- când? → când variabilele din A devin legate în $E_{[A/x]}$
- ce redenumim? → parametri formali ai tuturor funcțiilor din E care conțin apariții libere ale lui x în corp și au ca parametru formal numele unei variabile libere din A (redenumirea parametrilor formali implică folosirea noului nume în toate aparițiile libere ale parametrilor formali în corpurile funcțiilor respective).
- la ce redenumim? → la un nume care nu este nume de variabilă liberă în A sau în propriul corp, și care nu devine legat în corp.

Pas de reducere

Cum efectuăm o reducere corectă?

[α -conversie] + β -reducere fără coliziuni

- 1 avem β -redex
- 2 dacă este cazul, efectuăm α -conversie
- 3 efectuăm β -reducere

Secvență de reducere

Cum facem o reducere completă?

Secvență de reducere = \rightarrow^*

- Dacă expresia este reductibilă (are o secvență de reducere care se termină), reducerea în ordine **stânga-dreapta** se va termina cu valoarea expresiei.